

数学の研究を始めよう 2017/feb  
君はオイラー 完全数をみたか ; 後編  
 $P = 3$  の場合, ツチノコを探す

飯高 茂

平成 28 年 7 月 24 日

## 1 オイラーの $\varphi$ 完全数

オイラーの  $\varphi$  完全数 についての方程式は次のとおり:

$$P\varphi(a) = \overline{Pa} + Pm - \overline{P\text{Maxp}(a)}$$

ここで  $\overline{P} = P - 1$ , かつ  $\text{Maxp}(a)$  は  $a$  の最大素因子を示す. 本講では  $P = 3$  の場合のみを扱う.

オイラーの  $\varphi$  完全数 についての基本定理を再録する.

定理 1  $m \geq 0$  のとき

$$P\varphi(a) = \overline{Pa} + Pm - \overline{P\text{Maxp}(a)}$$

を満たす解は

- 〈1〉  $m = 0, e = 1$  のとき微小解  $a = Pq_0 (P > q_0; \text{素数})$  となる.
- 〈2〉  $m = P - 1$  のときの微小解  $a = P^e$ .
- 〈3〉  $e > 1$  のとき  $a$  は  $(\varphi, m)$ -完全数
- 〈4〉  $e = 1$  のとき  $a = Pq, q = P + m$  は素数.

## 2 $P = 3$ のとき

$P = 3$  のとき狭義の完全数では  $q = 2 * 3^{e-1} + 1 + m$  が素数という条件がついた. この条件を使うと:

- $1 + m$  が偶数なら,  $q$  は偶数なので  $q = 2$ .
- $e > 1$  のとき  $1 + m$  が 3 の倍数なら  $q = 3$ .

狭義の完全数ではこのようになることを踏まえて,

$1 + m \equiv 2, 4 \pmod{6}$  なら  $I_2, I_4$  型,  
 $1 + m \equiv 0, 3 \pmod{6}$  なら  $II_0, II_3$  型,  
 それ以外の  $1 + m \equiv 1, 5 \pmod{6}$  を III 型という.

この分類を意識しながら広義の完全数について調べる.

$$P\varphi(a) = \overline{Pa} - P\overline{\text{Maxp}(a)} + Pm$$

において  $P = 3$  とすると

$$3\varphi(a) = 2a - 3\overline{\text{Maxp}(a)} + 3m.$$

この解が広義のオイラー  $\varphi$  完全数である. これをすべて決定したい.

### 2.1 $P = 3, m = -1 - 2K$

$m + 1 = -2K$  のときも解がないことを示そう.

実際,

$$3\varphi(a) = 2a - 3(q + 2K).$$

これより  $a$  は 3 の倍数になり  $a = 3^e L$ , ( $L$  は 3 で割れない) の形に書く.

よって,

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 2K.$$

これより  $q$ : 偶数になり矛盾.

6 を法とすれば,  $I_2, I_4, II_0$  型のどれかになるがこのとき解はない.

## 3 $P = 3, m \geq 0$ のとき

### 3.1 $P = 3, m = 0$ のとき

$1 + m = 1$  なので, III 型

パソコンによる結果

beginable[!ht]  $P = 3, m = 0$

$e$	$a$	素因数分解
1	6	$3 * 2$
2	63	$3^2 * 7$
3	513	$3^3 * 19$
5	39609	$3^5 * 163$
6	355023	$3^6 * 487$

$m = 0$  のとき  $3\varphi(a) - 2a = 3(q - 1)$  を満たす.  $a = 3^e L$  ( $3, L$  は互いに素) と書けるので  $2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q - 1$  を満たす.

$L$ : 素数なら  $2 * 3^{e-1} + 1 = q$ .

$L$ : 非素数なら  $\text{co}\varphi(L) \geq q$  から矛盾.

基本定理によれば  $m = 0, e = 1$  のとき微小解  $a = Pq_0$  ( $P > q_0$ ; 素数).

$P = 3, q_0 = 2, a = 6$  が解.

$$3\varphi(a) = 2a - 3\overline{\text{Maxp}(a)} + 3m.$$

これより  $a$  は 3 の倍数になり  $a = 3^e L$ , ( $L$  は 3 で割れない) の形に書く.

よって,

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q - 1 - m.$$

$L$ : 素数なら  $q = 2 * 3^{e-1} + 1 + m$ : 素数となる  $e$  を探せば  $a = 3^e q$  が解.

$L$ : 非素数なら  $\text{co}\varphi(L) \geq q$  により矛盾.

$e = 1$  のとき,  $2 = q - 1 - m$ . すなわち  $q = 3 + m, L = q, a = 3q$ .

表 1:  $q = 3 + m$ ; 素数

$m$	$q = 3 + m$	$a = 3q$	素因数分解
2	5	15	$3 * 5$
4	7	21	$3 * 7$
8	11	33	$3 * 11$
10	13	39	$3 * 13$
14	17	51	$3 * 17$
20	23	69	$3 * 23$
26	29	87	$3 * 29$
28	31	93	$3 * 31$

### 3.2 $P = 3, m = 2$ のとき

$1 + m = 3$  なので,  $\Pi_3$  型

パソコンでの計算結果は次の通り.

$m = 2 \geq 0$  なので  $q = 2 * 3^{e-1} + 1 + 2$  が素数の場合を調べればよい. オイラー完全数の基本定理が使える.

$e = 1, m = 2$  のとき,  $q = 2 + 1 + 2 = 5, a = 15$ .

$m = P - 1 = 2$  なので  $a = 3^e$  が解である.

また  $P = 3, m = 2, q = 3 + 2 = 5$ . 基本定理 (4) により  $a = 3 * 5$  が解. これは孤立解.

これ以外の解がないことを確認する.

表 2:  $m = 2; 3\varphi(a) = 2a - 3\overline{\text{Maxp}(a)} + 6$

$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
3	[3]	2
9	[3 <sup>2</sup> ]	6
15	[3, 5]	8
27	[3 <sup>3</sup> ]	18
81	[3 <sup>4</sup> ]	54
243	[3 <sup>5</sup> ]	162
729	[3 <sup>6</sup> ]	486
2187	[3 <sup>7</sup> ]	1458
6561	[3 <sup>8</sup> ]	4374
19683	[3 <sup>9</sup> ]	13122

$q = 2 * 3^{e-1} + 1 + 2 = \varphi(3^e) + 3$  が素数なので  $e > 1$  なら  $q = 3$ . これから矛盾.  $e = 1$  ならば  $q = 5, a * 3 * 5 = 15$ .

### 3.3 $P = 3, m = 6$ のとき

表 3:  $P = 3, m = 6$

$a$	素因数分解
117	$3^2 * 13$
4941	$3^4 * 61$

$1 + m = 7$  なので III 型.

一見して解が少ないが wxmaxima で探すとゾロゾロでてきた.

表 4:  $P = 3, m = 6, q = 2 * 3^{e-1} + 1 + 6$  :素数

$e$	$a$	素因数分解
2	117	$3^2 * 13$
4	4941	$3^4 * 61$
10	2324936277	$3^{10} * 39373$
12	188290077741	$3^{12} * 354301$
16	1235347093894941	$3^{16} * 28697821$
18	100063092909942837	$3^{18} * 258280333$
25	478598658467166079446267	$3^{25} * 564859072969$

3 番目の  $a = 2324936277$  から急激に巨大化.

$a \equiv 1, 7 \pmod{10}$  が成り立つ.

### 3.4 $P = 3, m = 8$ のとき

表 5:  $P = 3, m = 8$

$a$	素因数分解
33	$3 * 11$

$m + 1 = 9 \equiv 3 \pmod{6}$ . なので  $\Pi_3$  型

$m = 8$  のとき  $q = 2 * 3^{e-1} + 9$  素数とする.  $e$  を探せば  $e = 1, q = 11$ .  $a = 3 * 11$  が解.

表 6:  $P = 3, m = 10$

$a$	素因数分解
39	$3 * 13$
153	$3^2 * 17$
783	$3^3 * 29$
42039	$3^5 * 173$

$m + 1 = 11 \equiv 5 \pmod{6}$ . なので III 型

表 7:  $P = 3, m = 10$

$e$	$a$	素因数分解
2	153	$3^2 * 17$
3	783	$3^3 * 29$
5	42039	$3^5 * 173$
14	15251247582633	$3^{14} * 3188657$
29	3140085798164918157432082839	$3^{29} * 45753584909933$
35	1668770336662161617890710746387343	$3^{35} * 33354363399333149$

表 8:  $P = 3, m = 12$

$a$	素因数分解
171	$3^2 * 19$
837	$3^3 * 31$
5427	$3^4 * 67$
363771	$3^6 * 499$

$m + 1 = 13 \equiv 1 \pmod{1}$ . なので III 型

以上みたように,  $m \geq 0$  なら  $q = 2 * 3^{e-1} + 1 + m$ : 素数, となるとき  $a = 3^e * q$  が解.

III 型するとき  $q = 2 * 3^{e-1} + 1 + m$ : 素数となる指数  $e$  は無数にあると期待, または想像される. これらの証明をいつかはしたいものだが久遠の夢である.

表 9:  $P = 3, m = 12$

$a$	素因数分解	
2	171	$3^2 * 19$
3	837	$3^3 * 31$
4	5427	$3^4 * 67$
6	363771	$3^6 * 499$
7	3217077	$3^7 * 1471$
12	188293266387	$3^{12} * 354307$
14	15251257148571	$3^{14} * 3188659$
28	348898422018537756444255507	$3^{28} * 15251194969987$

## 4 $P = 3, m < 0$ のとき

### 4.1 $P = 3, m = -2$ のとき

表 10:  $P = 3, m = -2$

$e$	$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
1	12	$[2^2, 3]$	4
2	45	$[3^2, 5]$	24
3	459	$[3^3, 17]$	288
4	4293	$[3^4, 53]$	2808

$P = 3$  のとき  $a = 3^e q$ , ( $q = 2 * 3^{e-1} + 1 + m$ : 素数) となる解を通常解という.  $a = 3 * 2^2$  は非通常解である.

$1 + m = -1$  なので III 型.

$m < 0$  なので非通常解が出てきた.

表 11:  $P = 3, m = -2 ; q = 2 * 3^{e-1} + 1 - 2$  が素数の場合

$e$	$e \bmod 4$	$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
2	2	45	$3^2 * 5$	24
3	3	459	$3^3 * 17$	288
4	0	4293	$3^4 * 53$	2808
8	0	28691253	$3^8 * 4373$	19123128
9	1	258260643	$3^9 * 13121$	172160640
13	1	1694575624563	$3^{13} * 106288$	1129716020160
21	1	72945992743881219603	$3^{21} * 6973568801$	48630661822280577600
24	0	53177628717632577039093	$3^{24} * 188286357653$	$A$
28	0	348898422018217481349886053	$3^{28} * 15251194969973$	$B$

$$A = 35451752478233431668408$$

$$B = 232598948012129736371620728$$

$e > 3$  のとき  $e \equiv 0, 1 \pmod{4}$ .

$3\varphi(a) = 2a - 3(m - q + 1)$ , ( $q = \text{Maxp}(a)$ ) を満たす.

$m = -2$  のとき  $3\varphi(a) - 2a = 3(-2 - q + 1) = -3(q + 1)$  を満たす.

$a \equiv 0 \pmod{3}$  により,  $a = 3^e L$  ( $3, L$  は互いに素).

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 1$  を満たす.

1.  $L$  が素数.

$\text{co}\varphi(L) = 1$  なので  $2 * 3^{e-1} = q + 1$ .

$L = 2$  または  $L \geq 5$ .

a).  $L = 2$ .

$q = 3$  になるので,  $2 * 3^{e-1} = q + 1 = 4$  により起きない.

b).  $q \geq 5$ .  $L = q$  になる. よって  $2 * 3^{e-1} = q + 1$  を満たすので  $2 * 3^{e-1} - 1$  が素数になる  $e$  を探して,  $q = 2 * 3^{e-1} - 1$  とおけば

$q = \varphi(3^e) - 1 + 2$ , になり  $a = 3^e q$  が解.

これは狭義の完全数である.

たとえば,  $e = 2$  のとき  $q = 2 * 3 - 1 = 5, a = 3^2 * 5$ ,

$e = 3$  のとき  $q = 2 * 9 - 1 = 17, a = 3^3 * 17$ .

2.  $L$  が非素数.

a).  $\text{Maxp}(L) < 3$  のとき  $L = 2^f, q = 3$ .

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 2^f * 3^{e-1} = q + 1 = 4$  によって,  $f = 2, e = 1; a = 3 * 2^2$ .

b).  $\text{Maxp}(L) > 3$ .

$a = 3^e L$  によって,  $q = \text{Maxp}(a) = \text{Maxp}(L)$ .

よって,  $\text{co}\varphi(L) \geq \text{Maxp}(L) = q$ .



$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 1 > 2 * 3^{e-1} * q$  により矛盾.

#### 4.2 $P = 3, m = -3$ のとき

$m + 1 = -2 \equiv 4 \pmod{6}$ .  $\Pi_4$  型 解なし 解なし

#### 4.3 $P = 3, m = -4$ のとき

表 12:  $P = 3, m = -4$

$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
18	$[2, 3^2]$	6

$m + 1 = -3 \equiv 3 \pmod{6}$ . なので  $\Pi_3$  型

$m = -4$  のとき  $3\varphi(a) - 2a = 3(-4 - q + 1) = -3(q + 3)$  を満たす.

$a \equiv 0 \pmod{3}$  により,  $a = 3^e L$ , ( $3, L$  は互いに素) とすると.

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 3$  を満たす.

これより  $e > 1$  なら  $q \equiv 0 \pmod{3}$ . ゆえに  $q = 3$ .

$e = 1$  なら  $q = -1$  で矛盾.

1.  $L$  が素数.

$\text{co}\varphi(L) = 1$  なので  $2 * 3^{e-1} = q + 3$ .

$e = 1$  なら  $q = -1$  となり矛盾.

$e > 1$  なら  $q = 3(2 * 3^{e-2} - 1)$  となり,  $e = 2, q = 3$  をえるので矛盾.

2.  $L$  が非素数.

a).  $\text{Maxp}(L) = 2$  のとき  $q = 3$ .  $L = 2^f$  とおくと

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 2^f * 3^{e-1} = q + 3 = 6.$$

$f = 1, e = 2$  よって,  $a = 2 * 3^2$ .

b).  $\text{Maxp}(L) = q > 3$  のとき.

$$q + 3 \geq 2 * 3^{e-1} q \geq 2q.$$

これより  $q = 3$  となり矛盾.

このとき解は 1 つのみ.

#### 4.4 $P = 3, m = -5$ のとき

$m + 1 = -4 \equiv 2 \pmod{6}$ .  $I_2$  型 解なし

#### 4.5 $P = 3, m = -6$ のとき

表 13:  $P = 3, m = -6$

$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
24	$[2^3, 3]$	8
75	$[3, 5^2]$	40
351	$[3^3, 13]$	216

$m + 1 = -5 \equiv 1 \pmod{6}$  なので III 型

表 14:  $P = 3, m = -6$   $q = 2 * 3^{e-1} + 1 - 6$  が素数の場合

$e$	$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
2	9	$3^2$	6
3	351	$3^3 * 13$	216
5	38151	$3^5 * 157$	25272
7	3177711	$3^7 * 1453$	2117016
11	20919820671	$3^{11} * 118093$	13946429016
13	1694569247271	$3^{13} * 1062877$	1129711768632
14	15251171055129	$3^{14} * 3188641$	10167444181440
20	8105110288604030529	$3^{20} * 2324522929$	5403406856744830752

$m = -6$  のとき  $3\varphi(a) - 2a = 3(-6 - q + 1) = -3(q + 5)$  を満たす.

$a \equiv 0 \pmod{3}$  により,  $a = 3^e L$ , ( $3, L$  は互いに素) とすると.

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 5$  を満たす.

$\text{Maxp}(L) = 2$  のとき  $q = 3, L = 2^f$ .

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 2^f * 3^{e-1} = q + 5 = 8$  を満たす.

よって,  $f = 3, e = 1. a = 2^3 * 3$ .

$\text{Maxp}(L) > 3$  のとき  $q = \text{Maxp}(L)$ .

1.  $L$  が素数.

$2 * 3^{e-1} = q + 5$  を満たす.

$q = 2 * 3^{e-1} - 5$  :素数 となる  $e$  を探す.

たとえば

$e = 3$  のとき  $q = 13$ .

2.  $L$  が非素数.

$\text{Maxp}(L) = q > 3$  のとき.  $2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 5$  を満たす.

$$q + 5 \geq 2 * 3^{e-1} q \geq 2q.$$

$q = 5$  となるとき  $e = 1$ .  $2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 5 = 10$  を満たす.

$3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 5$ ;  $e = 1, \text{co}\varphi(L) = 5$ .

よって,  $L = 5^2$ ;  $a = 3 * 5^2$

#### 4.6 $P = 3, m = -7$ のとき

解なし

#### 4.7 $P = 3, m = -8$ のとき

表 15:  $P = 3, m = -8$

$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
30	$[2, 3, 5]$	8
147	$[3, 7^2]$	84
297	$[3^3, 11]$	180
3807	$[3^4, 47]$	2484

$m + 1 = -7 \equiv 5 \pmod{6}$  なので III 型

表 16:  $P = 3, m = -8$ ;  $q = 2 * 3^{e-1} + 1 - 8$  が素数の場合

$e$	$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
3	297	$3^3 * 11$	180
4	3807	$3^4 * 47$	2484
6	349191	$3^6 * 479$	232308
7	3173337	$3^7 * 1451$	2114100
10	2324109591	$3^{10} * 39359$	1549367028

$m = -8$  のとき  $3\varphi(a) - 2a = 3(-8 - q + 1) = -3(q + 7)$  を満たす.  
 これより  $a \equiv 0 \pmod{3}$ . よって  $a = 3^e L$ , ( $3, L$ , は互いに素).  
 よって  $2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 5$  を満たす.

1.  $L$  が素数.

$2 * 3^{e-1} + 1 - 8 = q$ . たとえば  $e = 3$  とすると,  $q = 11; a = 3^3 * 11$ .

2.  $L$  が非素数.  $\text{Maxp}(L) = 2$  のとき  $q = 3, L = 2^f$ .

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 2^f * 3^{e-1} = q + 7 = 10 = 2 * 5$  を満たすことはできない.

$\text{Maxp}(L) > 3$  のとき  $q = \text{Maxp}(L)$ .

$\text{co}\varphi(L) \geq \text{Maxp}(L) = q$ . よって

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) + 1 = q + 8 \geq 2 * 3^{e-1} q.$$

$q + 8 \geq 2 * 3^{e-1} * q \geq 2 * q$ . よって,  $q \leq 8$  なので  $q = 7, 5$ .

a)  $q = 7$ .

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 7 = 2 * 7.$$

$e = 1$  になり  $\text{co}\varphi(L) = 7$ .  $L = 7^2$  または  $L = 3 * 5 = 15$ .

すると  $L = 7^2$  なら  $L = 7^2, e = 1, a = 3 * 7^2$ .  $L = 15$  なら  $L$  が 3 の倍数になり矛盾.

b)  $q = 5$ .

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 7 = 12.$$

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 12 = 2^2 * 3$  により

$3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 2 * 3$ . したがって,  $e = 1$  なら  $\text{co}\varphi(L) = 6$  により,  $L = 10; a = 2 * 3 * 5$ .

#### 4.8 $P = 3, m = -9$ のとき

$m = 1 - 9 = -8 \equiv 4 \pmod{6}$ .  $I_4$  型. 解なし

#### 4.9 $P = 3, m = -10$

表 17:  $P = 3, m = -10$

$a$	素因数分解	$\varphi(a)$
36	$[2^2, 3^2]$	12
42	$[2, 3, 7]$	12

$m + 1 = -9 \equiv 3 \pmod{6}$  なので  $\Pi_3$  型

$m = -10$  のとき  $3\varphi(a) - 2a = 3(-10 - q + 1) = -3(q + 9)$  を満たす.

$a \equiv 0 \pmod{3}$  により,  $a = 3^e L$ , ( $3, L$ , は互いに素) とすると.

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 9$  を満たす.

$\text{Maxp}(L) = 2$  のとき  $q = 3, L = 2^f$ .

$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 2^f * 3^{e-1} = q + 9 = 12 = 3 * 2^2$  を満たす.

ゆえに  $e - 1 = 1, f = 2; a = 2^2 * 3^2$ .

$\text{Maxp}(L) > 3$  のとき  $q = \text{Maxp}(L)$ .

1.  $L$  が素数.

$2 * 3^{e-1} + 1 - 10 = q$ . これを満たす素数  $q$  はない.

2.  $L$  が非素数.  $\text{co}\varphi(L) \geq q$  によって

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 9 \geq 2 * 3^{e-1} q.$$

$q + 9 \geq 2 * 3^{e-1} * q \geq 2 * q$ . よって,  $q \leq 9$  なので  $q = 7, 5$ .

a)  $q = 7$ .

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 9 = 16 = 2^4.$$

$e = 1$  になり  $\text{co}\varphi(L) = 8$ .  $L = 16$  または  $L = 14, 12$ .

$\text{Maxp}(L) = q = 7$  によれば  $L$  は  $q = 7$  の倍数. よって  $L = 14$ .  $e = 1$  により  $a = 2 * 3 * 7$ .

b)  $q = 5$ .

$$2 * 3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = q + 9 = 14.$$

よって

$3^{e-1} \text{co}\varphi(L) = 7$ . したがって,  $e = 1$  なら  $\text{co}\varphi(L) = 7$  により,  $L = 7^2$ .  $\text{Maxp}(L) = q = 5$  に反する.

#### 4.10 $P = 3, m = -11$ のとき

解なし

### 5 $P = 3, m = -4 - 6k$

$m = -10$  のとき解が2つしかない.

この理由を考えるために  $m = -10$  を法 6 で一般化すると  $m = -4 - 6K$  または  $m = -7 - 6K$  である.

$m = -4 - 6K$  のときは解がわずかながら見つかる. このとき東の丘という.

$m = -7 - 6K$  のときは解がまったく見つからない. このとき, 西の丘とすることにした.

私は東の丘には、ツチノコが少数ずついるが西の丘には、ツチノコが全然いない. それを証明しよう.

この場合の型を調べる.

$m = -4 - 6K$  ならば  $m + 1 = -3 - 6K \equiv 3 \pmod{6}$  なので  $\Pi_3$  型

$m = -7 - 6K$  ならば  $m + 1 = -6 - 6K \equiv 0 \pmod{6}$  なので  $\Pi_0$  型. この場合は起きない

#### 5.1 $P = 3, m = -16$

表 18:  $P = 3, m = -4 + 6K = -16, K = -2$

$a$	素因数分解
54	$2 * 3^3$
78	$2 * 3 * 13$
105	$3 * 5 * 7$

$m + 1 = -15 \equiv 3 \pmod{6}$  なので  $\Pi_3$  型